

# Le sida dans le monde

Décembre 2004



1, rue Nicholas, Suite 726 Ottawa ON K1N 7B7  
Téléphone: (613) 233-7440 • Téléc.: (613) 233-8361  
Courriel: [info@icad-cisd.com](mailto:info@icad-cisd.com) • Site Web: [www.icad.cisd.com](http://www.icad.cisd.com)

## Aperçu globale

Paramètre	Estimation	Étendue
Prévalence des infections à VIH	39.4 million	35.9 - 44.3 million
Nombre de femmes vivant avec le VIH	17.6 million	16.3 - 19.5 million
Nouvelles infections en 2004	4.9 million	4.3 - 6.4 million
Décès attribuables au sida en 2004	3.1 million	2.8 - 3.5 million

En 2004, le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida a augmenté dans toutes les régions du monde. Les hausses les plus marquées s'observent en Asie de l'Est, en Europe de l'Est et en Asie centrale. Au cours des deux dernières années, le nombre d'infections à VIH en Asie de l'Est a grimpé de près de 50%, une hausse largement attribuable aux épidémies croissantes en Chine, en Indonésie et au Viet Nam. Durant la même période, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale ont enregistré une augmentation de 40% des cas d'infection, notamment en raison d'une détérioration de la situation du VIH/sida en Ukraine et en Fédération de Russie. La Russie, qui comptait quelque 860 000 personnes vivant avec le VIH à la fin de 2003, connaît la plus grave épidémie de l'Europe. L'Afrique subsaharienne demeure l'épicentre de l'épidémie mondiale, avec quelque 25,4 millions de personnes séropositives - soit environ 1 million de plus qu'en 2002.

Il n'y a pas une seule et même épidémie à travers le monde. Plusieurs régions et pays sont aux prises avec des épidémies variées, dont certaines sont encore à un stade précoce. " Ces dernières tendances indiquent clairement que le sida constitue un problème de développement unique, a déclaré le Dr Peter Piot, directeur général de l'ONUSIDA, à l'occasion de la Journée mondiale du sida de 2004. L'heure n'est plus aux solutions de fortune et aux ripostes dans l'urgence. Il nous faut trouver un équilibre entre la nature urgente de la crise et la nécessité de mettre en place des solutions durables. "

## Femmes et sida : un problème qui s'aggrave

*Cette section ainsi que la suivante ont été prises textuellement d'un relevé de presse de l'ONUSIDA publié avant la Journée mondiale du sida 2004 (voir remerciements ci-dessous).*

Les femmes sont, sur le plan physique, plus sensibles à l'infection par le VIH que les hommes et la transmission d'un homme à une femme pendant les rapports sexuels a deux fois plus de risque de se produire que la transmission d'une femme à un homme.

Pour de nombreuses femmes des pays en développement, ce qu'on appelle l'ABC de la prévention (abstinence, fidélité et réduction du nombre de partenaires sexuels, et utilisation du préservatif) est insuffisant. "Des stratégies sont nécessaires d'urgence pour s'attaquer aux inégalités entre les sexes si nous voulons avoir une réelle chance d'inverser le cours de l'épidémie," a déclaré le Dr Piot. "Une action concrète est essentielle pour prévenir la violence à l'égard des femmes et assurer aux femmes comme aux filles l'accès à la propriété et à l'héritage, à l'éducation de base et à des

possibilités d'emploi." Par exemple, les jeunes femmes sont trois fois plus vulnérables à l'infection par le VIH que leurs homologues masculins. Outre leur vulnérabilité biologique accrue à l'infection, de nombreuses femmes et filles, notamment en Afrique australe, se retrouvent à utiliser les rapports sexuels comme une marchandise pour échanger des biens, des services, de l'argent ou des articles de première nécessité - souvent avec des hommes plus âgés. Ces rapports sexuels 'transactionnels' sont généralement associés à la pauvreté et au désir d'une vie meilleure.

## Les dernières tendances de l'épidémie de SIDA

Il n'y a pas une seule épidémie 'africaine'. Les épidémies qui se déroulent sur le continent sont extrêmement variées. L'Afrique australe reste la région la plus gravement touchée et les taux de prévalence du VIH y dépassent 25%. Au Botswana, Lesotho et Swaziland, les taux de prévalence parmi les femmes enceintes dépassent toujours 30%. L'espérance de vie a chuté au-dessous de 40 ans dans neuf pays de la région.

Malgré les baisses modestes des taux de prévalence du VIH en Afrique orientale, notamment en Ouganda et dans certaines parties de l'Éthiopie et du Kenya, le cours de l'épidémie est loin d'être inversé. À Addis Ababa, la prévalence du VIH est tombée à 11% en 2003, par rapport au maximum de 24% atteint au milieu des années 1990. Au Kenya, la prévalence du VIH a baissé de 13,6% en 1997 à 9,4% en 2002. Les Caraïbes restent la deuxième région la plus touchée du monde. La transmission du VIH s'y produit en grande partie par les rapports hétérosexuels, même si les rapports sexuels entre hommes, qui sont l'objet d'une importante stigmatisation, contribuent également à l'épidémie. Le SIDA est devenu la principale cause de décès parmi les adultes entre 15 et 44 ans dans la région.

En Amérique du Nord et en Europe, un nombre croissant de personnes contractent l'infection par des rapports hétérosexuels non protégés. Aux États-Unis, le SIDA frappe les femmes africaines-américaines et hispaniques de manière disproportionnée et il figure parmi les trois principales causes de décès pour les femmes africaines-américaines âgées de 35 à 44 ans. D'après Le point sur l'épidémie de SIDA 2004, il y a de fortes raisons de penser que pour de nombreuses femmes qui contractent l'infection, le principal facteur de risque est le comportement à risque souvent non divulgué de leurs partenaires masculins.

En Europe occidentale, les infections à VIH imputables aux rapports hétérosexuels ont plus que doublé entre 1997 et 2002. On craint que de nombreuses personnes infectées par le VIH ne soient toujours pas conscientes de leur sérologie VIH. Au Royaume-Uni, l'infection à VIH est maintenant l'affection grave à la croissance la plus rapide.

La consommation de drogues injectables est en hausse dans de nombreuses régions et contribue, pour une part de plus en plus importante, aux nouvelles infections à VIH, notamment dans les pays connaissant des épidémies émergentes en Europe orientale, en Asie centrale et dans certaines parties d'Asie.

*Ces données ont été compilées à partir des publications suivantes de l'ONUSIDA : Le point sur l'épidémie de sida - Décembre 2004 (publié conjointement par l'OMS/ONUSIDA); Rapport sur l'épidémie mondiale de sida 2004; et " Le nombre de femmes vivant avec le VIH augmente dans chacune des régions du monde ", communiqué de presse de l'ONUSIDA, 23 novembre 2004. Pour plus d'information, voir le site Internet de l'ONUSIDA ([www.unaids.org](http://www.unaids.org))*