

## LE SIDA ET LES FEMMES AUTOCHTONES



### *Voici les faits!*

La proportion de femmes chez les personnes autochtones atteintes du SIDA est plus élevée que dans le reste de la population. Les femmes autochtones ont plus de chance d'être infectées en bas âge que les hommes autochtones ou que la population générale.

Les femmes sont plus susceptibles d'être infectées que les hommes lorsqu'elles ont des rapports sexuels avec un homme séropositif.

En 1996, une clinique de la Colombie-Britannique qui traite la majorité des femmes enceintes séropositives de la province, 41 % (21/51) des femmes traitées étaient autochtones.

### *Pourquoi les femmes autochtones sont-elles plus susceptibles d'infection VIH/SIDA?*

Les femmes sont plus vulnérables que les hommes du point de vue biologique. Le taux de transmission d'homme à femme est de 2 à 4 fois supérieur à celui de femme à homme. Cela en raison du fait, principalement, que le sperme contient une plus haute concentration du VIH que le fluide vaginal.

Les jeunes filles sont particulièrement

vulnérables à l'infection par le VIH. Le col de l'utérus n'étant pas à maturité et la muqueuse vaginale n'offrant que peu de protection, l'infection est aisément transmise. De plus, il est plus fréquent que les adolescentes éprouvent des lésions des parois vaginales.

Les femmes sont plus souvent victimes de relations abusives. Cela leur enlève tout pouvoir de négociation durant les rapports sexuels pour adopter des pratiques moins risquées. Toute demande en ce sens peut entraîner des conséquences sérieuses telles que la violence ou l'abandon.

Les femmes sont plus vulnérables face aux rapports sexuels coercitifs, y compris le viol et autres formes d'exploitation sexuelle ou de prostitution.

Dans les situations coercitives ou d'exploitation, il y a peu de chances que les hommes portent un condom et que la femme puisse se protéger.

### *Qu'est-ce qui peut être fait pour aider?*

Plus d'éducation et d'information chez les femmes autochtones du Canada sont

nécessaires pour orienter les stratégies de prévention et de contrôle.

Des programmes VIH/SIDA destinés spécialement aux femmes autochtones doivent être élaborés avec leur participation à toutes les phases du processus.

Les fiches de données suivantes ont été préparées par le Réseau canadien autochtone du SIDA. Le Réseau canadien autochtone du sida, (RCAS, en anglais CAAN) est une coalition nationale de personnes et d'organismes autochtones ayant pour mission d'orienter, d'aider et de défendre les personnes autochtones vivant avec le VIH/sida ou touchées par cette maladie, indépendamment de la région où elles habitent. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le RCAS au 1-888-285-CAAN (2226).

# Réseau Canadien Autochtone du SIDA