

Le sida en Amérique latine et dans la Caraïbe



1, rue Nicholas Bureau 726 Ottawa ON K1N 7B7
Téléphone : (613) 233-7440 • Télécopieur : (613) 233-8361
Courriel : info@icad-cisd.com • Web : www.icad.cisd.com

Les personnes touchées

À la fin de 2002, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé estimaient que 1,9 million de personnes vivaient avec le VIH/sida, en Amérique latine et dans la Caraïbe. En 2001, plus de 100 000 personnes sont décédées des suites du sida et 210 000 autres ont contracté l'infection. Le VIH y touche surtout des populations marginalisées sur le plan social et économique. Certains pays de la Caraïbe présentent les pires taux d'infection après l'Afrique.

Portrait de l'épidémie

- En Amérique latine, le VIH continue de se propager par les voies de l'injection de drogue, des rapports sexuels entre hommes et des rapports hétérosexuels. La transmission du VIH par le partage de matériel d'injection est un problème croissant en Argentine, au Brésil, au Chili, au Paraguay, en Uruguay, aux Bermudes, à Porto Rico et dans le Nord du Mexique. Une étude menée dans sept pays de l'Amérique centrale a révélé des taux de prévalence du VIH variant de 8% à 18%, parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. D'autres études y ont observé des taux allant de 14% à Lima (Pérou) et 20% à Bogotá (Colombie), jusqu'à 28% à Guayaquil (Équateur). Près des trois quarts des cas de sida en Amérique centrale sont dus à des rapports hétérosexuels.
- Dans la Caraïbe, ce sont essentiellement les rapports hétérosexuels qui alimentent l'épidémie. Haïti en est le pays le plus affecté, avec un taux de prévalence du VIH de plus de 6%. Ce taux est de 3,5% aux Bahamas et de 2,5% en République dominicaine.
- Douze pays de la région, y compris la République dominicaine, présentent un taux de prévalence du VIH estimé à 1% ou plus, chez les femmes enceintes. Toutefois, en République dominicaine, des signes portent à croire que la prévalence du VIH commence à se stabiliser, voire à décliner, dans cette population. Des données indiquent une hausse de l'usage du condom parmi les travailleuses du sexe et une diminution du nombre de partenaires sexuel(le)s des hommes.
- Depuis une décennie, le ratio hommes/femmes vivant avec le VIH s'est grandement resserré – jusqu'à environ 3:1 en Amérique latine et 2:1 dans la Caraïbe. Paradoxalement, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ont contribué à cette tendance : des études ont montré qu'une grande partie d'entre eux ont aussi des rapports sexuels avec des femmes.
- Une étude dans trois prisons urbaines du Honduras a révélé des taux de prévalence du VIH de près de 7% parmi les détenus masculins. Ce taux atteint presque 5% parmi ceux de 16 à 20 ans. Moins de 10% des répondants ont affirmé utiliser régulièrement un condom.
- Au Brésil, la prévalence du VIH parmi les utilisateurs de drogue par injection a diminué considérablement dans certains centres urbains, grâce aux programmes de prévention. L'usage du condom parmi cette population est passé de 42% en 1999 à 65% en 2000. Des initiatives de réduction des méfaits à l'intention de ce groupe sont en développement en Argentine, au Chili, au Paraguay et en Uruguay.
- La plupart des pays de la région ont élaboré des programmes de prévention destinés aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, mais leur qualité varie et leur application est restreinte par des lois discriminatoires à l'égard de l'homosexualité. Le Brésil a développé des initiatives spécifiques pour s'attaquer à la vulnérabilité, au stigmatisation et à la discrimination que subit cette communauté.

La CISD a pour mission de réduire l'impact du VIH/sida dans les communautés et pays pauvres en ressources. Nous sommes une coalition d'organismes canadiens de développement international, de lutte contre le sida ainsi que d'individus et d'autres organismes concernés. Cette publication a été financée par Santé Canada. Les opinions qui y sont exprimées relèvent des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles de la ministre de la Santé. La majeure partie de l'information présentée dans ce feuillet est tirée de données publiées par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'occasion de la Journée mondiale du sida de 2002. Des exemplaires supplémentaires du présent feuillet peuvent être téléchargés du site Internet de la CISD, à www.icad-cisd.com. The Fact Sheet "AIDS in Latin America and the Caribbean" is available in English.