

Le sida en Afrique subsaharienne



1, rue Nicholas, Bureau 726 Ottawa ON K1N 7B7
Téléphone • Télécopieur : (613) 233-7440
Courriel : info@icad-cisd.com • Web : www.icad-cisd.com

Les personnes touchées

À la fin de 2002, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé estimaient que 29,4 millions de personnes vivaient avec le VIH ou le sida, en Afrique subsaharienne. En 2001, on y a recensé 2,4 millions de décès liés au sida et 3,5 millions de nouveaux cas d'infection à VIH. L'Afrique subsaharienne constitue l'épicentre de la pandémie mondiale; on y compte 70% des personnes vivant avec le VIH/sida dans le monde. En l'absence de vastes efforts de prévention, de soins et de traitements, on prévoit que le bilan des décès liés au sida continuera de s'alourdir, dans cette région, et qu'il atteindra son point culminant vers la fin de la présente décennie. Le pire reste à venir.

Portrait de l'épidémie

- **Les femmes sont touchées de manière disproportionnée.** Elles représentent 58% des adultes vivant avec le VIH/sida en Afrique subsaharienne – un pourcentage bien supérieur à ceux de toutes les autres régions.
- **Dans quatre pays du Sud de l'Afrique,** la prévalence du VIH chez les adultes dépasse maintenant les 30% : au Botswana (38,3%), au Lesotho (31%), au Swaziland (33,4%) et au Zimbabwe (33,7%). La crise alimentaire au Lesotho, au Swaziland et au Zimbabwe est directement liée aux ravages du sida.
- **L'épidémie continue de gagner du terrain en Afrique centrale et de l'Ouest.** Les taux de prévalence du VIH sont supérieurs à 5% dans 8 pays, notamment en République centrafricaine (12,9%), au Cameroun (11,8%), en Côte-d'Ivoire (9,7%) et au Nigeria (5,8%).
- **La grande majorité des personnes vivant avec le VIH/sida ne savent pas qu'elles sont séropositives.** Il y a pénurie de services de counselling et de test volontaires. Le stigmate et la discrimination continuent de décourager les gens de subir le test.
- **L'épidémie gagne du terrain en Afrique de l'Ouest.** Les taux de prévalence du VIH ont maintenant dépassé 5% au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte-d'Ivoire, au Nigeria et au Togo.
- **Le sida demeure la principale menace au développement de la région.** Il frappe durement parmi les travailleurs qualifiés et les professionnels. Dans certains pays, les systèmes de soins de santé ont perdu jusqu'à 25% de leur personnel, à cause de la maladie. La capacité des pays d'assurer l'ordre public est compromise.
- **Malgré l'abondance de mauvaises nouvelles, des signes encourageants** laissent entrevoir le contrôle éventuel de l'épidémie, en particulier chez les jeunes. En Afrique du Sud, la prévalence du VIH chez les femmes enceintes de moins de 20 ans est passée de 20% en 1998 à 15,4% en 2001. On a aussi noté une diminution de la prévalence du VIH parmi les femmes de quartiers défavorisés dans la ville d'Addis Ababa, en Éthiopie.
- **En Ouganda, on continue de constater que les interventions font une différence.** Les taux d'infection à VIH semblent diminuer dans certaines régions du pays. La prévalence du VIH continue de chuter chez les femmes enceintes de 15 à 19 ans. L'utilisation du condom par les femmes célibataires a presque doublé, entre 1995 et 2000-2001.
- **Dix-neuf gouvernements africains ont créé des instances nationales de lutte contre le sida aux échelons supérieurs.** Quarante pays ont établi des plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH/sida. Des instances régionales africaines abordent le sida en tant que problème de développement.
- **Seule une mince portion des millions d'Africains qui ont besoin d'antirétroviraux en obtiennent effectivement.** Des millions de gens ne reçoivent pas non plus de traitements contre les infections opportunistes. L'ONUSIDA et l'OMS ont affirmé que ces réalités reflètent l'échec mondial à élaborer une réaction proportionnelle à l'ampleur et à la gravité de l'épidémie du sida dans le monde.
- **Le Botswana demeure le seul pays africain à avoir adopté une politique rendant les antirétroviraux accessibles** à tous les patients qui en ont besoin. Toutefois, seulement quelque 2 000 personnes profitent présentement des bienfaits de cet engagement. Un petit nombre d'entreprises du Sud de l'Afrique ont annoncé des plans pour la fourniture d'antirétroviraux aux employés et à des membres de leurs familles.

La CISD a pour mission de réduire l'impact du VIH/sida dans les communautés et pays pauvres en ressources. Nous sommes une coalition d'organismes canadiens de développement international, de lutte contre le sida ainsi que d'individus et d'autres organismes concernés. Cette publication a été financée par Santé Canada. Les opinions qui y sont exprimées relèvent des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles de la ministre de la Santé. La majeure partie de l'information présentée dans ce feuillet est tirée de données publiées par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'occasion de la Journée mondiale du sida de 2002. Des exemplaires supplémentaires du présent feuillet peuvent être téléchargés du site Internet de la CISD, à www.icad-cisd.com. The Fact Sheet "AIDS in Sub-Saharan Africa" is available in English.