




QUI OFFRE LE SERVICE DE DÉPISTAGE ET DE PRÉVENTION DES ITSS?

Il existe près de chez vous un Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP) en CLSC. Ce service offre au même endroit des tests de dépistage ainsi que la consultation avant et après les tests, la vaccination, l'orientation vers d'autres ressources et du soutien. Ces services sont offerts par des professionnels de la santé, en toute confidentialité et dans le respect de la personne et de ses besoins.



**AU MOINS
UNE PERSONNE
INFECTÉE SUR TROIS
L'IGNORE.
PASSEZ UN TEST DE
DÉPISTAGE DES ITSS
ET DU SIDA.**

- Consultez le service de dépistage SIDEP;
- consultez un médecin;
- appelez Info-Santé;
- consultez la liste des centres de dépistage par région sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux : www.msss.gouv.qc.ca/itss



OUVREZ LES YEUX



OUVREZ LES YEUX



05-317-02
**LE DÉPISTAGE DES ITSS ET DU SIDA,
ÇA CONCERNE TOUT LE MONDE !**



OUVREZ LES YEUX

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) peuvent être présentes sans signes ou symptômes apparents, surtout au début de l'infection. Les personnes infectées peuvent transmettre l'infection sans le savoir.

UN TEST DE DÉPISTAGE CE N'EST PAS COMPLIQUÉ ET C'EST RAPIDE

Un échantillon d'urine suffit pour plusieurs de ces tests alors que pour certains autres, une prise de sang sera nécessaire.



LES ITSS, C'EST QUOI?

Connaissez-vous les infections transmissibles sexuellement et par le sang?

CE SONT :

- la chlamydia, les condylomes, la gonorrhée, l'herpès génital, la syphilis, le VIH/sida, les hépatites A, B et C.

ELLES PEUVENT SE TRANSMETTRE PAR :

- les relations sexuelles (orale, anale, vaginale) sans condom;
- le contact direct ou indirect avec le sang d'une personne infectée;
- le partage de matériel d'injection de drogues.

Ces infections et les complications qu'elles entraînent sont évitables et peuvent pour la plupart être traitées.

AVANT TOUT, IL FAUT PASSER UN TEST DE DÉPISTAGE APPROPRIÉ!



LES RAISONS POUR LESQUELLES DEMANDER UN TEST DE DÉPISTAGE DES ITSS.

LES ITSS TOUCHENT UN GRAND NOMBRE D'INDIVIDUS!

A-Vous ou votre partenaire avez eu des relations sexuelles sans condom avec :

- un nouveau ou une nouvelle partenaire;
- une personne qui a eu plusieurs partenaires;
- une personne qui a un nouveau partenaire dans le contexte d'un voyage;
- un nouveau partenaire originaire d'un pays endémique;
- un homme ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes;
- une personne infectée par le VIH;
- une personne qui a présentement une ITSS ou qui en a déjà eu une;
- un travailleur ou une travailleuse du sexe;
- une personne qui a utilisé des drogues injectables ou des stéroïdes.

B-Vous avez partagé du matériel d'injection ou d'inhalation de drogues, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie.

C-Vous vous êtes fait faire des tatouages ou un perçage (piercing) avec des aiguilles et du matériel usagés.

D-Vous avez une relation de couple stable et vous souhaitez cesser l'utilisation du condom.

E-Vous avez des doutes sur vos partenaires antérieurs, sur vos pratiques sexuelles, sur des contacts possibles avec le sang et vous craignez d'avoir contracté une infection.

Si l'une ou l'autre de ces situations correspond à la vôtre, vous devriez demander un test de dépistage des ITSS..